

MOTORE DI RICERCA: NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
testo scelto
Barriers to accessing psychotherapeutic care among young adults: Individual and regional associated factors
tema di ricerca
IL BISOGNO NON SODDISFATTO DI AIUTO PSICOTERAPEUTICO NEI GIOVANI ADULTI IN GERMANIA E LE BARRIERE INDIVIDUALI E REGIONALI
PAROLE CHIAVE
BARRIERA
ACCESSO
PSICOTERAPIA
GIOVANI ADULTI
ASSISTENZA SALUTE MENTALE
BISOGNO NON SODDISFATTO
DISPARITA REGIONALI
FATTORI
INDIPENDENTI
DIPENDENTI
• 1-Bisogno non soddisfatto di cure psicoterapeutiche .
• 2-Barriere percepite (5 dimensioni)
INDICATORI
• 1-Il bisogno non soddisfatto di cure psicoterapeutiche è stato valutato con la domanda: «Le è mai capitato di ricevere il consiglio di cercare un aiuto professionale o di averlo considerato lei stesso, ma di non averlo fatto?(si/no)
• 2- Le barriere sono state misurate utilizzando la Barriers to Seeking Psychotherapy Scale (BAPS), integrata con ulteriori item del CIDI, su una scala da 1 a 6
FATTORI INDIVIDUALI
FATTORI TERRITORIALI
• 1-Sesso
• 2-Età
• 3-Status sociale soggettivo
• 4-Sintomi despressivi
• 5-Sintomi ansioni
• 6-Uso problematico di sostanze
• 7-Qualità di vita legata alla salute mentale.
• 8-Alfabetizzazione sanitaria
• 1-Deprivazione socioeconomica del distretto .
• 2-Tipo di distretto (urbano, intermedio, rurale secondo la classificazione Eurosta
• 3- Densità dell'offerta di psicoterapia
• 4-Collocazione geografica (Germania orientale vs Germania occidentale).
INDICATORI
INDICATORI
• 1-Risposta alla domanda sul sesso assegnato alla nascita.
• 2-Età in anni, riportata come numero (fascia 16–25)
• 3-Risposta su una scala a 10 gradini (tipo "scala sociale": 1 status basso, 10 status alto).
• 4-Sintomi depressivi:punteggio al questionario PHQ-2 (2 domande)
• 5-Sintomi ansiosi: punteggio al questionario GAD-2 (2 domande)
• 6- Qualità della vita legata alla salute mentale (HRQoL):risposte a 2 domande del questionario PROMIS Global Mental Health
• 7-Uso di sostanze → livello "elevato" se ≥ 4 drink o uso di droghe in > 50% dei giorni.
• 8-Alfabetizzazione sanitaria → categoria inadequate / problematic / sufficient / excellent (M-POHL).
•
• 1-Valore dell'indice GISD (German Index of Socioeconomic Deprivation) attribuito al distretto di residenza.
• 2-Classificazione del distretto secondo Eurostat in tre categorie: urbano-intermedio-rurale.
• 3-numero di psicoterapeuti (sia medici sia psicologi)per 10.000 abitanti.
• 4-variabile binaria che indica se il distretto è in:Germania orientale oppure Germania occidentale.